

**คำชี้แจง** โปรดประเมินและบันทึกข้อมูลตั้งแต่แรกเริ่ม ๒๔ ชั่วโมง โดยทำเครื่องหมายวงกลมรอบคะแนนที่ประเมินได้

ลำดับที่	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ	คะแนนความเสี่ยง	
			แรกเริ่ม	ก่อนจำหน่าย
๑	ล้มครั้งล่าสุด	- ใน ๑ ปี ไม่เคยล้ม - ๑ ถึง ๓ ครั้งใน ๑ ปี - มากกว่า ๓ ครั้ง ใน ๑ ปี	๒ ๔ ๖	๒ ๔ ๖
๒	ยาที่ได้รับ - ยากล่อมประสาท - ยาด้านโรคซึมเศร้า - ยาสำหรับโรค Parkinson's - ยาที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายปัสสาวะ / อุจจาระ - ยาที่เกี่ยวข้องกับความดัน - ยานอนหลับ	- ไม่ได้รับยาเลย - ได้รับยา ๑ ชนิด - ได้รับยา ๒ ชนิด - ได้รับมากกว่า ๒ ชนิดขึ้นไป	๑ ๒ ๓ ๔	๑ ๒ ๓ ๔
๓	ภาวะทางสุขภาพจิต - วิดกกังวล(...../๒๑ คะแนน) - ภาวะซึมเศร้า(...../๒๑คะแนน) - การประสานงานลดลง** - การเคลื่อนไหวลดลง** - การมองเห็นลดลง *	- ไม่มีอาการ - ปรากฏอาการ ๑ อย่าง - ปรากฏอาการ ๒ อย่าง - ปรากฏอาการ ๒ อย่างขึ้นไป	๑ ๒ ๓ ๔	๑ ๒ ๓ ๔
๔	การรับรู้ใช้แบบประเมิน AMT: Hodkinson	คะแนน AMT ๙-๑๐ คะแนน AMT ๗-๘ คะแนน AMT ๕-๖ คะแนน AMT ๐-๔	๑ ๒ ๓ ๔	๑ ๒ ๓ ๔
๕	การเคลื่อนไหว	- ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยใดๆเลย - ไม่ค้ำยัน/ไม้เท้า/เครื่องช่วยเดิน/ขาเทียม - ใช้ไม้ค้ำยัน ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ร่วมด้วย เช่น มี w/c ร่วมด้วย	๑ ๒ ๓	๑ ๒ ๓
๖	การเดิน	- เดินได้ปกติ - อ่อนแรงสูญเสียการทรงตัวมีการจำกัดการเคลื่อนไหว - ไม่สามารถเดินได้เลย	๑ ๒ ๓	๑ ๒ ๓
๗	โรคร่วม/ภาวะที่เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม	- ไม่มีโรคร่วม - DM,HT,Heart ,DLP - Dementia,Delirium,Prakinson,Alzheimer,Spastic, OA,Old Fracture,Osteoporosis	๑ ๒ ๓	๑ ๒ ๓
Risk ๘ – ๑๖ คะแนน				
High Risk ๑๗ – ๒๗ คะแนน		รวมคะแนน (เต็ม ๒๗ คะแนน)		

ดัดแปลงมาจาก: The Falls Risk Assessment (FRAT) was developed by the peninsula Health Falls Prevention Services for a DH funded project in ๑๙๙๙

หมายเหตุ \*,\*\* ประเมินตามเอกสาร

แบบประเมิน AMT: Hodkinson คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย✓ ช่องคะแนนที่ประเมินได้

ลำดับ ที่	คำถาม	แรกรับ		ก่อนจำหน่าย		ลำดับที่	คำถาม	แรกรับ		ก่อนจำหน่าย	
		คะแนน		คะแนน				คะแนน		คะแนน	
		๐	๑	๐	๑			๐	๑	๐	๑
๑	อายุเท่าไร					๖	สามารถจำชื่อแพทย์หรือพยาบาลเจ้าของไข้ได้				
๒	เวลาเท่าไร					๗	วันที่คุณเกิด				
๓	ที่อยู่ปัจจุบัน					๘	วันพ่ของไทยวันที่เท่าไร				
๔	ปีนี้ พ.ศ. อะไร					๙	ไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองประชาธิปไตยปี พ.ศ.ใด				
๕	ที่นี้ที่ไหน					๑๐	นับเลขถอยหลังจาก ๒๐-๑				

ดัดแปลงมาจาก: Hodkinson H.M.(๑๙๗๒). Evaluation of a mental test score for assessment of mental impairment: in the elderly. Age aging,๑;๒๓๓-๘

หมายเหตุ: ๑. ผู้ป่วย/ผู้พิการที่ได้รับการประเมิน ต้องมีอายุเกิน๑๓ปี

๒. หากผู้ป่วย/ผู้พิการไม่สามารถให้ความร่วมมือ หรือเข้าใจคำสั่งได้ ผู้ประเมินอาจใช้วิธีสังเกต